



# ПРОГЕСТАМАГ®

15% ПРОГЕСТЕРОН

ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ  
ПРОДУКЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

**ПРОГЕСТЕРОН - гормон беременности  
для сохранения стельности**




**ВСЕГО ОДНА ИНЪЕКЦИЯ:**

- лечение гипофункции яичников у коров;
- снижение риска ранней эмбриональной смертности и абортов;
- синхронизация половой охоты у коров и телок.



## Схема синхронизации УЛЬТРАСИНХ совместно с витаминизацией и активацией иммунитета



ПРОГЕСТАМАГ® применяют:

- коровам с суточным удоем до 25 л - 10 мл;
- коровам с суточным удоем более 25 л - 15 мл.


СХЕМА УЛЬТРАСИНХ применяется для стимуляции прихода в охоту коров и тёлочек с целью:

- синхронизации эструса у животных в случаях, когда выявление половой охоты затруднено или невозможно;
- сокращения сервис-периода;
- осеменения животных с начальной стадией гипофункции яичников;
- осеменения высокопродуктивных животных с интенсивным обменом веществ.

## Схема профилактики эмбриональной смертности (в течение первых 3-х недель после осеменения)




## Схема лечения гипофункции яичников (при отсутствии половой охоты через 60 дней после отёла)



Пик прихода в охоту обычно происходит на 3-4 день после окончания схемы.

## Схема лечения фолликулярных кист (прогестероновый блок)



# ПРОГЕСТАМАГ®

15% суспензия прогестерона для инъекций

**Действующее вещество:**

прогестерон 150 мг в 1 мл.

**Способ введения:**

внутримышечно или подкожно.

**Фармакологические свойства:**

прогестерон ингибирует гипоталамо-гипофизарную систему, вследствие этого не происходит выделение гонадотропных гормонов фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ), и в результате не происходит созревание фолликулов и овуляции. По окончании действия препарата происходит спонтанная секреция гонадотропных гормонов ФСГ и ЛГ, что приводит к созреванию фолликулов и их овуляции.

**Показания:**

- лечение гипофункции яичников у коров;
- профилактика абортов и ранней эмбриональной смертности;
- синхронизация половой охоты у коров и тёлочек.

**БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ**

использование продукции животноводства в пищевых целях после применения препарата Прогестамаг®.

**Хранение:**

в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5° С до 25° С, после вскрытия флакона - при температуре от 2° С до 8° С.

**Срок годности:**

- 3 года;
- после вскрытия флакона 28 суток.

**Упаковка:**

стеклянные флаконы вместимостью 20 и 100 мл.