



МАГКОЛИСТИН®-ФОРТЕ

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ КАПЛИ



- **ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ**
(в 1 мл - 12 000 000 МЕ колистина сульфата)
- **НИЗКОЕ ПЕНООБРАЗОВАНИЕ**
- **ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД**



производство
МОСАГРОГЕН
ветеринарных препаратов

+7(495) 744-0645
www.mosagroen.ru



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- с водой для поения в течение 3-5 дней
- животные должны получать только воду с лекарственным препаратом
- лечебный раствор готовить ежедневно в объеме суточной потребности

ДОЗЫ

СВИНЬЯМ

- 100 000 МЕ колистина на 1 кг массы животного в сутки (0,085 мл препарата на 10 кг массы животного)

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЕ

(Бройлерам, цыплятам, племенной птице, ремонтному молодняку, курам-несушкам, индейкам)

- 75 000 МЕ колистина на 1 кг массы птицы (47-69 мл/1 тонну воды)

ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА

$$\frac{\text{Кол-во мл препарата на 1 л}}{1} = \frac{\text{МЕ на 1 кг массы} \times \text{средняя масса птицы в кг}}{\text{МЕ в 1 мл препарата} \times \text{суточная потребность птицы в воде (л/гол)}}$$

ПРЕИМУЩЕСТВО

- отсутствие активного пенообразования;
- точность и удобство дозирования;
- сокращение издержек логистики и хранения;
- низкая стоимость курса лечения.

МАГКОЛИСТИН® ФОРТЕ

Действующее вещество:

колистин сульфат – 12 000 000 МЕ/мл

Вспомогательные вещества:

трилон Б, метабисульфит натрия, сорбит, полиоксисалкиленгликоль, серная кислота и вода очищенная

Способ введения:

перорально

Фармакологические свойства:

Колистин, входящий в состав лекарственного препарата, активен в отношении многих грамотрицательных микроорганизмов, в том числе *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus spp.*, *Pasteurella spp.* Обладает бактерицидным эффектом. В одинаковой степени активен как в отношении размножающихся клеток, так и находящихся в состоянии покоя. Приобретенная бактериальная резистентность развивается очень медленно.

Колистин, связываясь с фосфолипидами цитоплазматической мембраны бактериальной клетки, усиливает ее проницаемость, что ведет к деструкции клетки.

При пероральном применении колистин практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте и не накапливается в органах и тканях животного. Выводится из организма, главным образом, в неизменной форме с фекалиями.

Показания:

Магколистин®-Форте назначают пороссятам, цыплятам-бройлерам, курам-несушкам и ремонтному молодняку кур при колибактериозе, сальмонеллезе и других желудочно-кишечных заболеваниях, вызванных грамотрицательными микроорганизмами, чувствительными к колистину.

Ограничение на использование продукции:

Яйцо - без ограничений
Мясо птиц и свиней – 2 суток

Хранение:

в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2 °С до 25 °С

Срок годности:

2 года

Упаковка:

полиэтиленовые канистры 1 л