



К.А.САВЕНКОВ
07 ДЕК 2021

ИНСТРУКЦИЯ по ветеринарному применению лекарственного препарата Энромаг-О®

(организация-разработчик: АО «Мосагроген»,
117545, г. Москва, проезд Дорожный 1-й, д. 1, стр. 1, пом. IV эт. 1 ком 6)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-4.19-4433 №ПВР-3-6.6/01960

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Энромаг-О® (Enromag-O).

Международное непатентованное наименование: энрофлоксацин.

2. Лекарственная форма: раствор для перорального применения.

Лекарственный препарат в 1 мл в качестве действующего вещества содержит энрофлоксацин - 100 мг, а также вспомогательные вещества: спирт бутиловый, калия гидроокись (для доведения рН), сахарин, ароматизатор пищевой Лосось и воду очищенную.

3. По внешнему виду представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до желтого цвета со специфическим запахом.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года с даты производства. После вскрытия канистры препарат хранению не подлежит. Запрещается применение препарата Энромаг-О® по истечении срока годности.

4. Энромаг-О® выпускают расфасованным по 0,5 и 1 л в полиэтиленовые канистры соответствующей вместимости, укупоренные резьбовыми пластмассовыми крышками с кольцом контроля первого вскрытия. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °C до 25 °C.

6. Энромаг-О® следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Энромаг-О® отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Энромаг-О[®] относится к фармакотерапевтической группе - производные нафтиридина, хинолоны и фторхинолоны.

10. Энрофлоксацин, входящий в состав лекарственного препарата, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий следующих видов: *E.coli*, *Haemophilus*, *Klebsiella*, *Pasteurella*, *Pseudomonas*, *Proteus*, *Bordetella*, *Brucella*, *Chlamydia*, *Enterobacter*, *Campylobacter*, *Erysipelothris*, *Corynebacterium*, *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Actinobacillus*, *Clostridium*, *Bacteroides*, *Fusobacterium*, а также микоплазм. Механизм бактерицидного действия энрофлоксацина основан на способности ингибировать активность фермента гиразы, обеспечивающего репликацию ДНК в бактериальной клетке.

При пероральном применении энрофлоксацин хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта, быстро поступает в кровь и проникает практически во все органы и ткани, достигая максимальной концентрации через 1,5-2,0 часа после применения; сохраняется в терапевтической концентрации в течение 24 часов. Энрофлоксацин частично метаболизируется, из организма выводится в основном в неизмененном виде и в виде метаболита - ципрофлоксамина, преимущественно с мочой и желчью.

Энромаг-О[®] по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Энромаг-О[®] назначают молодняку крупного и мелкого рогатого скота, поросятам и сельскохозяйственным птицам для лечения респираторных заболеваний, колибактериоза, сальмонеллёза, пастереллёза, некротического энтерита, гемофилёза, микоплазмоза, кампилобактерийного гепатита, инфекций, вызванных *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus*, а также смешанных и вторичных инфекций при вирусных заболеваниях, возбудители которых чувствительны к энрофлоксацину.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата Энромаг-О[®] является повышенная индивидуальная чувствительность животного к фторхинолонам (в том числе в анамнезе). Не следует применять препарат при существенных нарушениях развития хрящевой ткани, поражениях нервной системы, сопровождающихся судорогами, а также взрослым жвачным с развитым рубцовым пищеварением. Запрещается применение препарата курам-несушкам и ремонтному молодняку кур менее чем за 2 недели до начала яйцекладки, в связи с накоплением энрофлоксамина в яйцах.

13. При работе с препаратом Энромаг-О[®] следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с

лекарственными препаратами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Пустые канистры из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае возникновения аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Энромаг-О[®] не предназначен для применения самкам в период беременности и лактации. Не допускается применение препарата новорожденным животным.

15. Энромаг-О[®] применяют перорально с водой для поения в течение 3-5 дней, в следующих дозах:

Вид животного	Лечебная доза, мл/10кг массы	Лечебная доза, мл/10л воды
Телята	0,25-0,5	-
Ягнята	0,25-0,5	-
Поросята	0,25-0,5	-
Птицы	-	5,0

В период лечения животные должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат. Препарат готовят ежедневно из расчета потребности животных в воде.

При сальмонеллозе препарат применяют в двухкратной терапевтической дозе.

16. При применении препарата Энромаг-О[®] в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При возникновении аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные препараты и симптоматическую терапию.

17. При передозировке препарата у животного может наблюдаться снижение аппетита, угнетенное состояние, рвота, диарея.

18. Энромаг-О[®] не следует применять одновременно с хлорамфениколом, макролидами, теофиллином, нестероидными противовоспалительными средствами.

19. Особеностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Убой телят, ягнят и поросят на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток, птиц - не ранее, чем через 11 суток после последнего применения лекарственного препарата Энромаг-О®. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано для кормления пушных зверей.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

АО «Мосагроген»
Российская Федерация, 117545,
г. Москва,
1-ый Дорожный проезд, д. 1.

АО «Мосагроген»
Российская Федерация, 117545,
г. Москва, проезд Дорожный
1-ый, д. 1, стр. 1, пом. IV эт. 1
ком 6.
т/ф (495) 744-06-45.

Зам. генерального директора
АО «Мосагроген», к.т.н.

И.А. Казакова

