



МОСАГРОГЕН
ветеринарные препараты

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Председатель Комитета
ветеринарного контроля
и надзора МСХ РК

Тюлешев С.В.

«16» 05 2022 г.

НАСТАВЛЕНИЕ
по ветеринарному применению
лекарственного препарата Ципромаг®-О лакт

Организация-разработчик: АО «Мосагроген»
117545, г. Москва, проезд Дорожный 1-й, д.1, стр.1, пом. IV эт.1 ком 6.

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Ципромаг®-О лакт (Cipromag-O lact).

Международное непатентованное наименование: ципрофлоксацин.

2. Лекарственная форма: раствор для перорального применения.

Лекарственный препарат в 1 мл содержит в качестве действующего вещества ципрофлоксацина лактат (в пересчете на ципрофлоксацин) - 100 мг, а также вспомогательные вещества: пропиленгликоль, динатрия эдетат (трилон Б), бензиловый спирт, уксусную кислоту и воду очищенную.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до желтого цвета. Допускается легкая опалесценция.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года с даты производства. Запрещается использование лекарственного препарата после окончания срока его годности.

Ципромаг®-О лакт (раствор для перорального применения)



МОСАГРОГЕН
ветеринарные препараты

4. Ципромаг[®]-О лакт выпускают расфасованным по 1 л в полиэтиленовые канистры (бутылки) соответствующей вместимости, укупоренные резьбовыми пластмассовыми крышками с кольцом контроля первого вскрытия. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2 °С до 25 °С.

Препарат транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта, при температуре от 2 °С до 25°С.

6. Ципромаг[®]-О лакт следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Ципромаг[®]-О лакт отпускается без рецепта ветеринарного врача.

Краткая характеристика.

9. Ципромаг[®]-О лакт относится к фармакотерапевтической группе: производные нафтиридина, хинолоны, фторхинолоны.

10. Ципрофлоксацин, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром антибактериального и антимикоплазменного действия. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий следующих видов: *E. coli*, *Salmonella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Proteus spp.*, *Bordetella spp.*, *Brucella spp.*, *Chlamydia spp.*, *Enterobacter spp.*, *Campylobacter spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Corynebacterium spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Actinobacillus spp.*, *Clostridium spp.*, *Bacteroides spp.*, *Fusobacterium spp.*, *Corina spp.*, а также *Mycoplasma spp.*

Механизм действия ципрофлоксацина заключается в ингибировании активности фермента гиразы, обеспечивающего репликацию спирали ДНК в ядре бактериальной клетки, что приводит к нарушению синтеза белка и гибели микроорганизма. При пероральном введении лекарственного препарата ципрофлоксацин хорошо и быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте (биодоступность более 70%) и, поступая в кровь, проникает во все органы и ткани, достигая максимальной концентрации через 1,5-2,0 часа, терапевтическая концентрация сохраняется в течение 24 часов после введения лекарственного препарата.

Выводится ципрофлоксацин из организма в основном в неизмененном виде и частично в форме метаболитов с мочой и желчью.

Ципромаг[®]-О лакт (раствор для перорального применения)



МОСАГРОГЕН
ветеринарные препараты

Ципромаг®-О лакт по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах хорошо переносится животными, не обладает эмбриотоксическим, тератогенным и гепатотоксическим действием.

II. Порядок применения ветеринарного препарата

1) Процедуры перед использованием препарата:

Перед использованием тщательно ознакомьтесь с Инструкцией по применению ветеринарного препарата.

Ципромаг®-О лакт (раствор для перорального применения) разрешен для применения только в ветеринарной медицине! Применять его имеет право дипломированный специалист ветеринарной медицины.

2) Процедуры применения ветеринарного препарата:

11. Ципромаг®-О лакт назначают сельскохозяйственным и декоративным птицам с лечебной целью при колибактериозе, сальмонеллезе, хронических респираторных заболеваниях, стрептококкозе, некротическом энтерите, гемофилезе, микоплазмозе, смешанных инфекциях и вторичных инфекциях при вирусных болезнях, возбудители которых чувствительны к ципрофлоксацину.

12. Противопоказанием для применения является индивидуальная повышенная чувствительность птицы к компонентам лекарственного препарата. Запрещается применение лекарственного препарата курам-несушкам и ремонтному молодняку птиц менее чем за 2 недели до начала яйцекладки, ввиду накопления ципрофлоксацина в яйце.

3) Способ применения, дозировки и режим дозирования:

13. Ципромаг®-О лакт назначают птицам с водой для поения в дозе 10 мг ципрофлоксацина на 1 кг массы птицы в сутки из расчета - 5 мл препарата на 10 л воды в течение 3-5 дней. При сальмонеллезе, смешанных инфекциях и при хронических формах заболеваний – не менее 5 дней.

В период лечения птица должна получать только воду, содержащую лекарственный препарат. Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление птицей в течение суток. Менять лекарственный раствор необходимо каждые 24 часа.

Если в течение 2-3 дней не произойдет заметного клинического улучшения, рекомендуется провести повторную проверку чувствительности выделенных от больной птицы микроорганизмов к фторхинолонам или заменить Ципромаг®-О лакт на антибактериальный лекарственный препарат другой фармакотерапевтической группы.

Ципромаг®-О лакт (раствор для перорального применения)



МОСАГРОГЕН

ветеринарные препараты

4) Содержание и использование животных после применения ветеринарного препарата, включая период до следующей обработки животных другими ветеринарными препаратами:

Специальных мер не требуется.

5) Сроки наступления иммунитета и его длительности при разных способах применения ветеринарного препарата:

Не применимо.

6) Реакция животных, включая реакцию в месте введения ветеринарного препарата и общей температурной и клинической реакций животного, а также их интенсивности и длительности:

14. При применении препарата Ципромаг[®]-О лакт в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у птиц, как правило, не наблюдается.

15. При передозировке лекарственного препарата может наблюдаться отказ от корма, нарушение функций желудочно-кишечного тракта, снижение привесов. В случае проявления передозировки применение препарата следует прекратить и провести необходимую симптоматическую терапию.

7) Меры предотвращения возможных осложнений в результате применения ветеринарного препарата (включая причину осложнений, их вид, интенсивность и длительность):

16. Не допускается одновременное применение препарата Ципромаг[®]-О лакт с хлорамфениколом, макролидами, тетрациклинами, теофиллином и нестероидными противовоспалительными средствами.

17. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

18. Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют как можно скорее в той же дозировке и по той же схеме.

8) Использования сырья и продукции от животных, на которых применялся ветеринарный препарат (с указанием вида сырья и продукции и периода их использования после применения ветеринарного препарата):

Убой птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 12 суток после последнего применения препарата Ципромаг[®]-О лакт. Мясо птиц, вынужденно убитых до истечения установленного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.



МОСАГРОГЕН
ветеринарные препараты

Наименование, адрес организации, АО «Мосагроген»
уполномоченной держателем или Российской Федерация, 117545, г.
владельцем регистрационного Москва, проезд Дорожный 1-ый,
удостоверения лекарственного препарата д. 1, стр. 1, пом. IV эт. 1 ком 6.
на принятие претензий от потребителя. т/ф (495) 744-06-45.

Зам. генерального директора
АО «Мосагроген»



И.А. Казакова